

Onkruidbeheersing

Onkruiden. Vrijwel nergens geliefd, maar toch overal aanwezig. Ze kunnen afschrikken om een akkerrand aan te leggen. Begrijpelijk, want onkruiden kunnen een hardnekkig probleem vormen. Toch kan goed akkerrandbeheer onkruiden terug dringen. Door te kijken naar de akkerrand, de voorkomende soorten en de onkruiden kan er op geanticipeerd worden. De akkerrand vertelt je hoe de rand wordt beheert en wat er gedaan moet worden om het gewenste resultaat te krijgen.

Onkruid-gebruiksaanwijzing:	Als je de informatie links weet, dan kan je die gebruiken om de onkruiden te bestrijden door de groeiomstandigheden te veranderen.	
Eenjarig, 2-jarig of meerjarig	Neem bijvoorbeeld bijvoet; een meerjarige stikstof minnende plant die bloeit in het tweede jaar. Ze komt veel voor op ruigte (zandgronden). Door een paar keer per jaar te maaien en maaisel af te voeren verschaal je de grond. Hierdoor raak je bijvoet kwijt.	
Voorjaar- najaarskiemer of jaarrond	Heb je onkruid dat zich vermeerdert door zaad, wees er op tijd bij en maai voor de zaadzetting. Vermeerdert een onkruid via wortelstokken, laat de grond dan zo veel mogelijk met rust om scheuren (en dus vermeerderen) van de wortelstok te voorkomen.	Bijvoet
Verspreiding via zaad of via wortelstokken		Meerjarig
Vroeg- of laatbloeiers		Stikstof minnend
Winterhard		Bloeit in 2de jaar
Andere leefgebieden van het onkruid.		Komt voor op ruigtes (zandgrond)

Maaien is in veel gevallen een nuttige maatregel als het gaat om onkruidbeheersing.

Let op!

Laat bij voorkeur een rustperiode van **ten minste 8 weken** tussen twee maaibeurten. Hierdoor bieden we vogels een kans om een cyclus te voltooien; van het broeden tot aan de kuikens die kunnen vluchten voor de maaibalk. Wees extra voorzichtig met het maaien op het hoogtepunt van het broedseizoen. Dit loopt voor veel vogels van april tot begin augustus.

Najaarsinzaai

Het inzaaien van een akkerrand in het najaar zorgt voor minder onkruiddruk. Het gezaaide mengsel krijgt zo een voorsprong op de onkruiden en hierdoor hebben onkruiden minder kans.

Minimale grondbewerking

Pas zo min mogelijk bodembewerking toe. Sommige zaden hebben licht nodig om te kiemen. Door bodembewerking worden ze naar de oppervlakte gebracht waardoor ze kunnen kiemen. Onder andere melde is een lichtkiemer. Start daarom juist wel met een vals zaaibed, maar laat de grond na inzaai zoveel mogelijk met rust. Met een meerjarige akkerrand heb je dit probleem veel minder.

Bokashi

Komt er veel maaisel van je rand? Maak er bokashi van! ANOG voert een regiodeal project uit waarbij het maaien en afvoeren van een akkerrand wordt gecombineerd met bokashi maken. Hierbij wordt gekeken naar een zo praktisch mogelijke invulling en samenwerking tussen meerdere akkerbouwers. Meer weten? Kijk op <https://anog.nl/projecten/regiodeal-natuurinclusieve-landbouw>

Fauna volgt flora

Een goed ontwikkelde bufferstrook biedt habitat voor vele soorten insecten en vogels. Dit is te bereiken door doordacht beheer!

